

## گزیدگی پشه آئدس

گزش پشه آئدس میتواند منجر به تب دنگی شود. این بیماری با علایم سرما خوردگی (سردرد، میالژی، بدن درد، درد مفاصل، درد پشت چشم، تهوع، استفراغ و اسهال) شروع می شود و اغلب بدون عارضه خاصی بهبود خواهد یافت. درصد اندکی از این بیماران در روزهای دوم تا هفتم ممکن است دچار بیماری شدید و کشنده گردند. دو سندرم بالینی خطرناک در این گروه از بیماران مشاهده می گردد. سندرم اول، بروز علایم افت فشار خون و اختلال مولتی ارگان است و سندرم دوم با علایم درد و تندرns شکم، استفراغ مکرر، خونریزی از لثه ها، مخاط ها و دستگاه گوارش (هماتمز و ملنا)، لتارژی و بی قراری و کاهش پلاکت بروز خواهد نمود. انتقال بین دو انسان صرفا با گزش پشه و یا انتقال خون و فراورده های خونی رخ می دهد.

### پرسش های کلیدی

۱. ارزیابی وضعیت هوشیاری بیمار (در صورت نیاز، به پروتکل کاهش سطح هوشیاری هم رجوع کنید).
۲. ارزیابی وضعیت تنفس بیمار (در صورت نیاز، به پروتکل تنفس هم رجوع کنید).
۳. جست و جوی نشانه های همراه احساس تنگی نفس، سیاهی رفتن چشم ها یا دوران سر، تپش قلب، درد قفسه سینه، تهوع، استفراغ، درد شکم، اسهال، استفراغ خونی، خونریزی لثه و بشورات
۴. آیا فرد دیگری هم علامت دارد؟
۵. چه مدت از زمان شروع بیماری و تب گذشته است؟
۶. آیا مشکلات بیمار در حال بدتر شدن است؟

### سطوح اولویت اعزام

قرمز	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ کماتوز / بدون پاسخ تحریک دردناک</li> <li>♦ هوشیاری ناکامل یا بی قراری شدید</li> <li>♦ عدم وجود تنفس، تنفس غیرمؤثر</li> <li>♦ سیانوز</li> <li>♦ نشانه های مشکلات حاد و ناپایداری راه هوایی و تنفس شامل صدا دار شدن تنفس، تقلای تنفسی، ناتوانی در تکلم، ناتوانی در بلع بزاق، تغییر صدا، اشکال در بلع، احساس توده در گلو یا ...</li> <li>♦ علایم عمومی تب دنگی (مانند: تب، میالژی، درد شکم، درد پشت چشم و ...) همراه با شواهد افت شدید فشار خون</li> </ul>
زرد	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ سیاهی رفتن چشم ها یا احساس سبکی در سر یا تعریق شدید</li> <li>♦ همراه با افت هوشیاری که در حال حاضر بهبود یافته</li> <li>♦ هرگونه نشانه اختلال تنفسی به جز موارد اولویت قرمز</li> <li>♦ علایم عمومی تب دنگی (مانند: تب، میالژی، درد شکم، درد پشت چشم) همراه با خونریزی لثه، ملنا، هماتمز، خونریزی واژینال، تشدید تنگی نفس و استفراغ خونی</li> <li>♦ شرایط رو به بدتر شدن</li> </ul>

سفید	<p>♦ علائم عمومی تب دنگی (مانند: تب، میالژی، درد شکم، درد پشت چشم) بدون شواهد اولیت قرمز و زرد</p> <p><b>نکته:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ در موارد سفید توصیه به مراجعه سرپایی به مراکز درمانی</li> <li>❖ تحت نظر قرار دادن بیمار از نظر بروز علائم شوک (تعریق سرد، ضعف، بیحالی) و یا خونریزی (از لثه، استفراغ خونی و ...)</li> </ul>
<b>توصیه‌های پیش از رسیدن EMS</b>	
<p>۱. رعایت اصول پیشگیری شامل جلوگیری از گزش پشه (استفاده از پمادهای دئودرانت، پوشاندن اندام‌ها و ...)</p> <p>۲. به بیمار به جز استامینوفن هیچ داروی تب بر دیگری داده نشود.</p> <p>در کودک شربت/قرص (در صورت سابقه مصرف قبلی) / شیاف استامینوفن ۱۰ تا ۱۵ میلی‌گرم بر وزن یا شربت/قرص (در صورت سابقه مصرف قبلی) / در بزرگسالان قرص/شیاف استامینوفن ۵۰۰ میلی‌گرم.</p> <p>۳. اعلام موارد به سوپروایزر/مسئول شیفت برای اعلام به EOC</p>	